

Okénko zahrádkáře.

Průběh začátku letošního roku byl teplotně nad dlouhodobým normálem s minimálními dešťovými srážkami. Od začátku letošního roku spadlo na Znojemsku pouze asi 12 mm dešťových srážek.

Zimní „spánek“ ovocných dřevin končí v období měsíce ledna a února. Meruňky ukončují zimní „spánek“ již ke konci ledna, nejdříve pak stromy raných odrůd. Z tohoto pohledu současné teplé období aktivuje u meruňkových stromů fyziologický proces - proudění mízy. Pokud by přišly v dalším období větší mrazy, je i větší pravděpodobnost, že mráz poškodí jak vodivá pletiva ve větvích a v kmenech, tak případně i květní pupeny.

Současné teplé období způsobuje i dřívější rašení pupenů broskvoní a tím i umožňuje přístup infekci houby *Taphrina deformans*, původci kadeřavosti broskvoňových listů. Vhodný termín aplikace ochranného postřiku je signalizován začátkem rašení karmínově červených samičích květů u keřů lísky obecné, což nastalo již začátkem tohoto měsíce. Je tedy v těchto dnech již vhodná doba pro ošetření broskvoňových stromů proti kadeřavosti listů broskvoně.

K ochrannému postřiku použijeme měďnaté přípravky Champion 50 WP 0,6% nebo Flowbrix 0,3% či Kuprikol 50 1 %, z vlastních zásob. Pravděpodobně v případě teplejšího a hlavně vlhčího počasí v dalších dnech musíme počítat i s opakováním postřiku ještě jednou za cca 14 dní.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

-čepička-