

Okénko zahrádkáře.

Začátek června byl chladný, ale ke konci první dekády se výrazně oteplilo. Úhrn dešťových srážek v první červnové dekádě byl značně rozdílný podle lokalit. Nejméně napršelo v okolí Stošikovic a Těšetic (22 mm) a nejvíce spadlo dešťových srážek v okolí státní hranice s Rakouskem (kolem 40 mm) a kolem Bohutic a Jiřic (50 mm). Podobně jako v druhé polovině května, tak i začátkem června byl průběh počasí podobný dle rčení v lidové pranostice – „Medardova kápě čtyřicet dní kape“. U jabloní je celková násada mladých plůdků průměrná a započal již červnový propad plůdků. Násada plodů u třešní je mírně pod dlouhodobým průměrem, ranější odrůdy třešní (Kaštánka, Burlat) se již sklízí. Přetrvává velký výskyt mšic u slivoní, mirabelek, švestek na vrcholcích mladých výhonů. Oteplení se také projevilo vysokou aktivitou letu obaleče jablečného a slupkového. Letorosty révy vinné mají dobré přírůstky, ze starého dřeva stále vyrůstají mladé výhonky ze spících oček. Letos mají révové keře velké množství květenství a keře středně raných odrůd révy začali již počátkem týdne kvést. U některých keřů na listech či mladých letorostech se vyskytuje slabší až střední výskyt kadeřavosti a plstnatosti (Chrupky). Jsou signalizovány optimální podmínky pro vývoj padlí révy.

V příštím týdnu bude aktuální ochrana jádovin proti obalečům, strupovitosti a padlí. K ochrannému postřiku použijeme přípravky: Zato 50 WG 0,015%, či Tercel 0,25% (ze soupravy Zdravé jablko) a také přípravky na škůdce: Mospilan 20 SP 0,025% nebo Decis 15 EW 0,07% či Calypso 480 SC 0,025%. Stromy slivoní a švestek ošetřujeme jen v případě většího výskytu mšic - Pirimor 50 WG 0,07% či Decis Mega 0,01%, který je účinný i proti ostatním škůdcům a současně použijeme přípravek i proti monilióze plodů: Talent 0,06% či Teldor 500 AC 0,05%. Révu vinnou ošetřujeme před květem jen v chladnějších lokalitách, kde keře révy dosud nekvětou kombinovanými přípravky s dlouhodobějším účinkem: Ridomil Gold MZ Pepite 0,25% nebo Melody Combi 65 WG 0,12% a přidáme Kumulus 0,3% proti padlí, který účinkuje také i na kadeřavost, plstnatost a svilušky.

U ovocných dřevin a vinné révy je vhodné přidávat do postřiků také listovou výživu či rostlinné stimulatory, které zlepšují výživu rostlin a částečně eliminují špatný příjem živin kořeny. Použijeme k tomu jeden z některých přípravků: Wuxal Calcium, Ekolist, Harmavit, Krystalon, Biostim, Terra Sorb Foliar, Envistar či Energen Fulhum.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

Na mladších stromech jabloní a hrušní můžeme mladé „konkurenční“ či stojaté výhony v bylinném stavu velmi dobře „vylámat“ a podpořit tak růst ostatních výhonů. Stále mechanicky odstraňujeme u odrůd náchylných k padlí vrcholky letorostů napadené padlím

V závislosti na růstovém vývoji keřů révy dokončujeme podlom letorostů v horní části révového keře a mladé letorosty prostrkujeme do dvojdrátí, případně již vylamujeme zálistky v zóně květenství. Letorosty z podoček či neplodné letorosty, které zahušťují keř a nebudeme je potřebovat pro řez a tvarování v příštím roce odstraňujeme. U stolních odrůd je vhodné ponechávat na letorostu jen jedno květenství.

-Čepička-