

Okénko zahrádkáře.

Průběh začátku letošního roku byl teplotně mírně nad dlouhodobým normálem s dešťovými srážkami v rámci dlouhodobého normálu. Za první dva měsíce letošního roku spadlo na Znojemsku cca 35 – 48 mm dešťových srážek.

Zimní „spánek“ ovocných dřevin končí v období během měsíce ledna a února. Meruňky ukončují zimní „spánek“ již v polovině ledna, nejdříve pak stromy raných odrůd. Z tohoto pohledu teplé období aktivuje u meruňkových stromů fyziologické procesy - proudění mízy. Pokud by přišly v dalším období větší mrazy, je větší pravděpodobnost, že mráz poškodí jak vodivá pletiva ve větvích a kmenech, tak i také narašené květní pupeny.

Současné neobvykle teplé období způsobuje i dřívější rašení pupenů broskvoní a tím umožňuje přístup pro infekci houby Taphrina, původci kadeřavosti broskvoňových listů. Vhodný termín je signalizován začátkem rašení karmínově červených samičích květů u keřů lísky, což již nastalo. Je tedy v těchto dnech již vhodná doba pro ošetření broskvoňových stromů proti kadeřavosti listů broskvoně.

K ochrannému postřiku použijeme měďnaté přípravky Champion 50 WP 0,6% nebo Flowbrix 0,3% či Kuprikol 50 1 %, z vlastních zásob. Pravděpodobně v případě teplejšího a hlavně vlhčího počasí v dalších dnech musíme počítat i s opakováním postřiku ještě jednou za cca 14 dní.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

-jč-