

Okénko zahrádkáře.

Měsíc duben byl teplotně mírně nadprůměrný s menším množstvím dešťových srážek (okolí Znojma) ve výši 12 – 26 mm. Za první dva dny měsíce května spadlo 2 - 6 mm dešťových srážek. Stromy jabloní dokvétají, nebo jsou v chladnějších lokalitách ještě v plném květu. Keře révy vinné jsou vyrašené s délkou letorostů 5 – 30 cm. Celkově je vegetační doba u trvalých kultur urychlená o cca dva týdny.

V této vývojové fázi jaderovin – po odkvětu, je nutné počítat s ochranným postřikem proti houbovým chorobám, především strupovitosti, padlí a škůdcům – mšicím, píd'alkám a obaleči jablečném. U hrušní musíme počítat i s ochranou proti rzi hrušňové, obaleči a mérám. Tento ochranný zásah je jeden z nejdůležitějších v ochraně jaderovin a navíc je letos menší množství nasazených mladých plůdků a po deštích posledních dní je i delší ovlhčení listů. Ošetřujeme přípravky: Topas 100 EC 0,045% nebo Discus 0,02% či Zato 50 WG 0,015% a na škůdce přidáme Decis Mega 0,01%, nebo Calypso 480 BC 0,025% či Mospilan 20 SP 0,02%. U hrušní volíme přípravky, které účinkují jak na strupovitost, tak i na rez - Delan, Discus, Merpan, Polyram, Thiram a Zato. Vyšší napadení rzi na listech hrušní podporuje blízkost konifer – Thují, Cypřišů a Jalovců. Proti mérám přidáme přírodní olej Rock Effect v koncentraci 0,5 – 1%, tento přípravek „odpuzuje“ škůdce a navíc působí i proti padlí. U jabloní je vhodné přidávat do postřiků listovou výživu, která zlepšuje výživu rostlin vápníkem a ostatními prvky a preventivně eliminuje pozdější hořkou pihovitost plodů jablek.

Porost jahodníku po dešťových přeháňkách ošetřujeme na konci kvetení přípravky proti plísni šedé na plodech: Mythos 30 SC 0,25% nebo Teldor 500 SC 0,15% či Thiram Granuflo 0,25% .

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.

-Čepička-